

## SUAUGUSIŲJŲ SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija	Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalba	Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos
1	2	3
1 kategorija	Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esamas ar gresiantis širdies ir (ar) kvėpavimo sustojimas. Pacientas po gaivinimo.</li> <li>2. Kvėpavimo dažnis (toliau – KD) &lt; 10 kartų per minutę KD &gt;29 kartai per minutę.</li> <li>3. Sistolinis arterinis kraujo spaudimas (toliau – AKS) &lt; 80 mmHg.</li> <li>4. Sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glazgo komų skalę (toliau – GCS) &lt; 9 balai.</li> <li>5. Viso kūno traukuliai.</li> <li>6. Intraveninis vaistų arba narkotikų perdozavimas, sukėlęs hipoventiliaciją ir hemodinamikos sutrikimą.</li> <li>7. Ūminis cheminis akių pažeidimas.</li> </ol>
2 kategorija	Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ūmus, gyvybei grėsmingas kvėpavimo ir (ar) kraujotakos sutrikimas.</li> <li>2. Ūmus didelio kraujo kiekio (25 procentų cirkuliuojančio kraujo kiekio arba daugiau) netekimas.</li> <li>3. Labai stiprus / nepakeliamas skausmas dėl įvairių priežasčių, kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal dešimties balų skalę.</li> <li>4. Hipoglikemija arba hiperglikemija, kai gresia pavojus išsivystyti hipoglikeminei komai, diabetinei ketoacidozei arba hiperosmoliarinei hiperglikemijai.</li> <li>5. Karščiavimas, kai yra klinikinių sepsio požymių (ne mažiau kaip du iš šių požymių: KD &gt; 22 kartai per minutę, AKS &lt; 100mmHg, bet kokio lygio sąmonės sutrikimas). Bendras kūno atšalimas, kai temperatūra &lt; 36 °C.</li> <li>6. Sunki trauma.</li> <li>7. Didelės rizikos anamnezė: <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. didelio raminamųjų medžiagų kiekio suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų suvartojimas;</li> <li>7.2. kitas gyvybei pavojingas apsinuodijimas;</li> <li>7.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija).</li> </ol> </li> <li>8. Psichikos ir elgesio sutrikimai: <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams;</li> <li>8.2. intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.</li> </ol> </li> </ol>
3 kategorija	Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 30 min.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hipertenzinė krizė su greitai progresuojančiais širdies-kraujagyslių ir (ar) centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiais.</li> <li>2. Vidutinio sunkumo nukraujavimas su klinikiniais požymiais dėl bet kokios priežasties.</li> <li>3. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS &lt; 13 balų).</li> </ol>

	<p>nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Oksigenacija &lt; 90 procentų.</li> <li>5. Besikartojantys traukuliai, užfiksuoti per pastarąsias 12 valandų.</li> <li>6. Besikartojantis vėmimas ir (ar) viduriavimas esant sisteminei intoksikacijai.</li> <li>7. Ūmi dehidratacija.</li> <li>8. Galvos trauma ir trumpalaikis sąmonės netekimas.</li> <li>9. Stiprus skausmas, vertinamas 6–8 balais pagal dešimties balų skalę, kai reikia skubiai numalšinti skausmą.</li> <li>10. Ūmi židininė neurologinė simptomatika.</li> <li>11. Galūnės trauma, dėl kurios sutriko kraujotaka.</li> <li>12. Psichikos ir elgesio sutrikimai: <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1. mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė;</li> <li>12.2. ūmios psichozės;</li> <li>12.3. sunki psichologinė trauma, sukianti elgesio sutrikimus;</li> <li>12.4. sunki depresija;</li> <li>12.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas.</li> </ol> </li> <li>13. Kiauryminis akies sužalojimas ar ūmus visiškas regėjimo netekimas.</li> </ol>
4 kategorija	<p>Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 60 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karščiavimas &gt; 39 °C, nepraeinantis vartojant geriamuosius vaistus ilgiau kaip 24 valandas.</li> <li>2. Ūmus per pastarąsias 48 valandas atsiradęs širdies ritmo (supraventrikulinė tachikardija, prieširdžių virpėjimas, prieširdžių plazdėjimas, plačių kompleksų tachikardija) ar laidumo (II–III laipsnio AV blokada, atrioventrikulinis ritmas) sutrikimas.</li> <li>3. Šlapimo sulaikymas, anurija, dializuojamo paciento komplikacijos: A/V šunto trombozė, dializinio kateterio iškritimas / trombozė / disfunkcija.</li> <li>4. Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje būta psichozių, traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus psichoaktyviųjų medžiagų potraukis).</li> <li>5. Pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai.</li> <li>6. Kitos traumos (nenurodytos 2 ir 3 kategorijose) ir nelaimingi atsitikimai, įvykę per pastarąsias 48 valandas, esant didėjančiam tynimui, stiprėjančiam funkcijos sutrikimui.</li> <li>7. Erkių įsisiurbimas.</li> <li>8. Veido ir žandikaulių srities pūliavimas.</li> <li>9. Dirbtinai suformuotų stomų sutrikimai (kai reikia jas pakeisti ar atkimšti).</li> <li>10. Negausus kraujavimas iš makšties arba pilvo skausmas nėštumo metu.</li> <li>11. Komplikacijos po medicininės intervencijos (iširusi siūlė, pūlingos išskyros, didėjantis tynimas, nepakankama imobilizacija), atsiradusios iki 48 val. po procedūros arba išrašymo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.</li> <li>12. Svetimkūniai audiniuose arba natūraliose kūno angose / kūno ertmėse, atsiradę per pastarąsias 48 valandas.</li> </ol>